



1 em cada 2 pessoas que sofrem de sensibilidade não refere ao Profissional de Saúde Oral que sente dor.¹

É uma destas pessoas?




Não sofra em silêncio

Saiba mais sobre as causas da sensibilidade dentária e sobre o que pode fazer

Qual é a causa da sensibilidade dentária?

A sensibilidade dentária é um problema comum, também conhecido por hipersensibilidade dentinária. Ocorre quando a dentina está exposta.

Quando a dentina está exposta, milhões de canais microscópicos, chamados dentina tubular, estão abertos. Em consequência, os estímulos tais como o frio, o quente ou o ar acionam os nervos, causando uma dor aguda ou um desconforto.



A hipersensibilidade dentinária pode ser causada por vários fatores, entre os quais:

- **Recessão das gengivas:** ocorre quando as gengivas se retraem, expondo a dentina. A gengivite é a principal causa da retração das gengivas.
- **Desgaste do dente:** ocorre quando o esmalte que cobre a coroa desaparece devido a escovagens realizadas com demasiada força e / ou ao consumo de bebidas e de alimentos ácidos.

Como poderá prevenir e tratar a sensibilidade dentária?



Tente reduzir o consumo de alimentos ácidos e de refrigerantes.



Pergunte ao seu Profissional de Saúde Oral como pode evitar escovar demasiado os dentes e utilizar uma escova de dentes com filamentos suaves. Usar água tépida durante a escovagem pode ajudar.



Peça ao seu Profissional de Saúde Oral que lhe recomende um dentífrico desenvolvido para aliviar a dor causada pela sensibilidade, tal como o elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™.

Como atua o elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™]?



O dentífrico elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™] contém uma tecnologia Pro-Argin[®] única que liga e sela a dentina tubular com uma camada rica em cálcio, proporcionando um alívio imediato*² da dor causada pela sensibilidade.

A camada é uma barreira capaz de resistir às bebidas e aos alimentos ácidos e é fortalecida pela utilização regular do dentífrico, garantindo um alívio duradouro da dor causada pela sensibilidade.^{3,4}



CNP: 6609206

PRO-ARGIN[®] TECNOLOGIA



Para um alívio imediato:



Aplicar o dentífrico diretamente na área sensível e, com a ponta do dedo, massajar delicadamente durante um minuto.

Para um alívio duradouro:



Escovar os dentes duas vezes por dia com uma escova de dentes com filamentos suaves.

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto.

elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™] - para dentes sensíveis

Dentífrico elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™]

Alívio imediato*² e duradouro da dor em dentes sensíveis^{2,3} a partir da primeira utilização.

Elixir elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™]

Elixir oral com tecnologia clinicamente comprovada que alivia a dor em dentes sensíveis.⁵

Escova de dentes elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™]

Os filamentos suaves eliminam a placa dos espaços interdentais e da margem das gengivas, proporcionando uma lavagem profunda e suave dos colos dos dentes abertos e dos dentes sensíveis.



«É um facto que este dentífrico reduz a sensibilidade dentária.»⁶

Inquirido que sofre de sensibilidade, Polónia, 2017

Não sofra em silêncio! Peça ao seu Profissional de Saúde Oral informação sobre elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™].

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto

1 Colgate-Palmolive. Estudo de mercado realizado pela Zapera. Dados em arquivo. 2009. 2 Nathoo S., et al. J Clin Dent. 2009; 20 (edição especial): 123–130. 3 Docimo R., et al. J Clin Dent. 2009; 20 (edição especial): 17–22. 4 Relatório Deon Hines-0003, 2016. 5 Boneta A., et al. J Dent. 2011; 41: 34–41. 6 Ipsos, Programa de Experiência do Paciente na Polónia com o elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™] Repara e Previne, resultados recolhidos após duas semanas de experiência, 325 inquiridos, 2017.

elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™] dentífrico e elixir são dispositivos médicos para o alívio da sensibilidade dentária. Para alívio imediato da dor, massageie de forma suave diretamente na área do dente sensível com a ponta do dedo por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Crianças com menos de 12 anos: Não utilize a aplicação com a ponta do dedo para alívio imediato da dor. Crianças até 6 anos: utilizar uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com supervisão durante a escovagem para minimizar a deglutição. Se estiver a tomar flúor proveniente de outras fontes, consulte o seu dentista ou o seu médico. Leia cuidadosamente a rotulagem. Data de revisão: Novembro 2020. Código interno 004.