



O que é que os seus doentes não lhe estão a dizer?

50% das pessoas que sofrem de sensibilidade não referem que sentem dor.¹



Descubra como pode ajudá-las a conseguir um alívio
imediat^{*4} e **duradouro**⁵



CNP: 6609206

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto

Eis as **justificações possíveis** para se manterem em silêncio:²

Não quero incomodar o meu
Profissional de Saúde Oral

Tenho medo de um
tratamento doloroso

Não quero que as consultas
se prolonguem

Às vezes doem-me os dentes,
mas deve ser um problema meu

Faça a triagem e identifique rapidamente os doentes que sofrem de sensibilidade:



Doentes com re-
cessão gengival



Após raspagem e
alisamento radicular



Após branqueamento
profissional

Ajude-os a aliviar a dor com
elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™



com
PRO-ARGIN®

A tecnologia PRO-ARGIN® de elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™ proporciona uma oclusão superior dos túbulos dentinários



Tecnologia
PRO-ARGIN®




A arginina e o cálcio* formam um complexo com carga positiva.

A tecnologia PRO-ARGIN® adere à superfície da dentina com carga negativa.


Forma instantaneamente uma camada rica em cálcio que sela os túbulos abertos, para um alívio duradouro.

Oclusão superior² dos túbulos



67%

de oclusão da dentina^{†‡}



91%

de oclusão da dentina^{†‡}

Tecnologia do fluoreto de estanho / fluoreto de sódio

Dentífrico elmex® SENSITIVE PROFESSIONAL™

Eficácia comprovada^{4,5}

Alívio imediato^{‡4}

60.5%
de redução[§] da dor

imediatamente após a aplicação



Alívio duradouro⁵

80.5%
de redução[§] da dor

após 8 semanas de escovagem



* Do carbonato de cálcio

‡ Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto

† Estudo *in vitro*, imagens confocais reais após cinco tratamentos

§ Redução relativamente ao estado inicial. $p < 0,001$

Os doentes confirmam a eficácia de elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™]



93%
dos doentes

confirmam a redução da hipersensibilidade dentária⁶



91%
dos doentes

estão satisfeitos com a recomendação⁶ do médico dentista



Recomende elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™] para um alívio imediato^{*4} e duradouro⁵ da dor



CNP: 6609206

- Oclusão superior^{**2} da dentina tubular
- Alívio imediato^{*4} a partir da primeira utilização
- Alívio duradouro⁵ da dor se utilizado duas vezes por dia

Reforce a sua recomendação com o sistema completo elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™]

O sistema (dentífrico e elixir) com a tecnologia Pro-Argin[®] reduz a hipersensibilidade dentinária 2 vezes mais do que um sistema de sais de potássio, com 8 semanas de uso⁷



CNP: 6615575

* Para um alívio imediato, aplicar diretamente no dente sensível com a ponta do dedo e massajar delicadamente durante um minuto.

** Quando comparado com o fluoreto de estanho / fluoreto de sódio.

1. Colgate-Palmolive. Estudo de mercado realizado pela Zapera. Dados em arquivo. 2009. 2. Beaton et al. Med Princ Pract. 2014; 23 (4): 295-301. 3. Hines D. et al. Cartaz #3406, julho 2018 IADR Colgate-Palmolive Company 2018. 4. Nathoo S. et al. J Clin Dent. 2009; 20 (edição especial): 123-130. 5. Docimo R. et al. J Clin Dent. 2009; 20: (edição especial): 17-22. 6. Ipsos, Programa de Experiência do Paciente na Polónia com o elmex[®] SENSITIVE PROFESSIONAL[™] Repara e Previne, resultados recolhidos após duas semanas de experiência, 325 inquiridos, 2017. 7. Boneta A, et al. J Dent. 201; 41:34-41.

elmex[®] sensitive Professional[™] dentífrico e elixir são dispositivos médicos para o alívio da sensibilidade dentária. Para alívio imediato da dor, massageie de forma suave diretamente na área do dente sensível com a ponta do dedo por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Crianças com menos de 12 anos: Não utilize a aplicação com a ponta do dedo para alívio imediato da dor. Crianças até 6 anos: utilizar uma quantidade do tamanho de uma ervilha, com supervisão durante a escovagem para minimizar a deglutição. Se estiver a tomar flúor proveniente de outras fontes, consulte o seu dentista ou o seu médico. Leia cuidadosamente a rotulagem. Data de revisão: Novembro 2020. Código interno 002.